

### 1. Hepatitis B:

Pauta 0 - 2 - 4 y 11 meses para recién nacidos de madres portadoras de AgHBs junto con Inmunoglobulina antihepatitis B.

### 2. Vacuna antineumocócica conjugada (VNC):

Pauta 2+1 con la VNC15 (2, 4 y 11 meses) Vaxnuevance o pauta 3+1 (2, 4, 6 y 11-15 meses) con la VNC20. "Prevenar 20"

Niños de 15 meses a menos de 5 años de edad completamente vacunados previamente con Prevenar 13:

Una dosis única (0,5 ml) Si se ha administrado Prevenar 13, deben transcurrir al menos 8 semanas antes de administrar Prevenar 20.

Niños y adolescentes de 5 años a menos de 18 años de edad, independientemente de la vacunación previa con Prevenar 13: Una dosis única (0,5 ml)

Si se ha administrado Prevenar 13, deben transcurrir al menos 8 semanas antes de administrar Prevenar 20.

### 3. Vacuna frente al virus del papiloma humano (VPH):

Vacunación sistemática universal frente al VPH, tanto de chicas como de chicos, a los 12 años, con dos dosis. Se recomienda la vacuna con más genotipos, VPH9 (Gardasil 9).

Pautas de vacunación: dos dosis (0 y 6 meses) entre 9 y 14 años y pauta de tres dosis para ≥15 años. Es posible su coadministración con las vacunas MenACWY, hepatitis A y B y Tdpa/Td. No hay datos de coadministración con la vacuna de la varicela, aunque no debería plantear problemas.

### 4. Vacuna frente a la gripe:

Se recomienda para todos los niños de 6 a 24 meses de edad, con vacunas inactivadas por vía intramuscular; a partir de los 2 años de edad con vacuna atenuada intranasal. Se aplicará una sola dosis

### 5. Vacuna de Hepatitis A:

Recomendadas 2 dosis separadas por 6-12 meses a partir de los 12 meses de edad.

### 6. Vacuna rotavirus:

Límite de la primera dosis 12 semanas de edad. Límite última dosis, 24 semanas para Rotarix y 32 semanas de vida para Rotateq.

### 7. Antimeningocócica B:

Bexsero tres dosis empezando a los tres meses de edad; los no vacunados 2 dosis desde los dos años de edad-. Trumenba, a partir de los 10 años de edad, dos dosis.

### 8. Vacuna conjugada frente a los meningococos ACWY (MenACWY):

Una dosis de vacuna conjugada MenACWY-TT a los 2 y 4 meses de edad y refuerzo a los 12 meses.

NO VACUNADOS; a partir de 12 meses de edad: Una dosis única.

### 9. Virus respiratorio sincitial (VRS):

Nirsevimab (anticuerpo anti-VRS) en todos los recién nacidos durante la temporada del VRS (de octubre a marzo) y lactantes menores de seis meses (nacidos entre abril y septiembre) al inicio de la temporada. **MUY IMPORTANTE ADMINISTRAR EN LOS PRIMEROS DÍAS DE VIDA**

### 10. Tetravírica:

La segunda dosis de triple vírica y varicela se puede administrar en forma de "pinchazo único" como tetravírica (SRVP/PROQUAD).

### 11. Vacuna frente al SARS-CoV-2:

Solo en niños pertenecientes a grupos de riesgo.

## CALENDARIO VACUNAL 2025/26 PEDIATRÍA

### Infanrix Hexa (Glaxo), Hexion (Sanofi-Pasteur), Vaxelis (MSD):

Difteria, Tétanos, Tos ferina, Polio inactivada, Meningitis Haemophilus, Hepatitis B

### Infanrix IPV Hib (Glaxo):

Difteria, Tétanos, Tos ferina, Polio inactivada, Meningitis Haemophilus

### Infanrix IPV (Glaxo):

Difteria, Tétanos, Tos ferina, Polio inactivada

Infanrix (Glaxo): Difteria, Tétanos, Tos ferina

Bexsero (Glaxo), Trumenba (Pfizer): Meningococo B

Rotateq (MSD), Rotarix (Glaxo): Rotavirus

Prevenar 20 (Pfizer), Vaxneuvance (MSD): Neumococo

Varivax (MSD), Varilrix (Glaxo): Varicela

MMR Vax Pro (MSD), Priorix (Glaxo): Sarampión, Rubéola, Paperas

Havrix 720 (Glaxo), Vaqta 25 (MSD): Hepatitis A

Gardasil 9 (MSD), Cervarix (Glaxo): Papiloma

Boostrix (Glaxo): Tétanos, Tos ferina atenuada y Difteria atenuada

Nimenrix (Pfizer), MenQuadfi (Sanofi): Tetravalente Antimeningocócica ACWY

Fluenz Tetra: Gripe intranasal

Fluarix o Vaxigrip Tetra: Gripe inactivada parental

Proquad (MSD): Tetravírica: sarampión, rubéola, paperas y varicela

La aparición de fiebre y dolor puede ser normal en las primeras 24-36 horas y la inflamación de la pierna puede ser más duradera.

1. Dosis necesaria de antitérmicos .....

.....

.....

2. Caso de aparecer fiebre o dolor administrar el antitérmico/analgésico que les hemos recomendado cada 4-6 horas.

3. Inflamación en el punto de la vacuna. Aplicar paños de calor seco (calentados con la plancha).

4. Será importante que se aporte el calendario vacunal en cada visita que realice en nuestros centros. Ante cualquier duda consulte con nuestros pediatras.

## CALENDARIO VACUNAL 2025/26 PEDIATRÍA



**CENTRAL:** C/ Molina Lario, 7, 2º. Tels. 952 609 669 · 619 446 551

**MÁLAGA 1:** Plaza Uncibay, 8 . Tels. 952 220 176 · 619 446 551

**ARROYO de la MIEL:** Clínica Arroyo . Salvador Vicente 6 · Tels. 952 576 363 · 619 446 551

**TORREMOLINOS:** Hospital Internacional HM Santa Elana. Urb. Los Álamos,s/n  
Tels. 952 385 555 · 619 446 551

**ALHAURIN DE LA TORRE:** Pol. Lacibis Martínez. C/ Leandro Fdez. de Moratín 3-1  
(Frente Centro Salud) · Tels. 951 511 818 · 619 446 551

**Tel. 619 446 551 · 952 609 669 · [www.grupouncibay.es](http://www.grupouncibay.es)**

*Escribiendo el Futuro de la Pediatría*

# CALENDARIO VACUNAL 2025/26

